

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به آنتی هیستامین ها، داروهای دیگر، غذاها، رنگها، و مواد محافظ.
- در صورت مصرف داروهای دیگر مانند تضعیف کننده های سیستم عصبی مرکزی مانند الکل، باربیتورات ها، خواب آورها، ضد دردهای مخدر، آرامبخش های ضد اضطراب و داروهای ضد جنون، داروهای آنتی کولینرژیک و آمینوگلیکوزیدها (ممکن است مصرف همزمان علائم مسمومیت گوشی را بپوشانند).
- در صورت ابتلا به گلوکوم، احتیاس ادرار، هیپرپلازی پروستات، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، پورفیریا و پایین بودن فشارخون

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تنها طبق نظر پزشک متخصص باشد.

هشدارها:

- کودکان و افراد سالمند نسبت به این دارو حساسترند.
- مصرف این دارو قبل از رانندگی و کارهای دقیق که احتیاج به هوشیاری کامل دارند و نیز کار با ماشین آلات خودداری کنید.
- این دارو ممکن است سبب خشکی دهان، بینی و گلو شود. برای تسکین موقتی خشکی دهان میتوانید از آدامس های بدون قند، آدامس و تکه های یخ استفاده کرد. اگر خشکی دهان بیش از ۲ هفته طول کشید با پزشک مشورت کنید.
- دوز بالای این دارو باید در افرادی که فشارخون پایین دارند با احتیاط مصرف شود.
- مصرف این دارو ممکن است نتایج آزمایشات پوستی تشخیصی آلرژی را تغییر دهد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

- سرگیجه و عدم تعادل: بزرگسالان: ۳۰ میلی گرم ۳ بار در روز یا ۷۵ میلی گرم ۱ یا ۲ بار در روز
- کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال: نصف دوز بزرگسالان
- بیماری مسافرت: بزرگسالان: ۳۰ میلی گرم ۲ ساعت قبل از شروع مسافرت و سپس در صورت نیاز ۱۵ میلی گرم هر ۸ ساعت. کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال: نصف دوز بزرگسالان
- اختلالات عروقی مغزی: بزرگسالان: ۷۵ میلی گرم ۱ تا ۳ بار در روز
- اختلالات عروقی محیطی: بزرگسالان: ۷۵ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است موجب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک مشورت کنید: خواب آلودگی، گیجی، عدم تطابق (این عوارض معمولاً پس از چند روز از بین می رود) سردرد، اثرات آنتی موسکارینی (نظیر خشکی دهان ، تاری دید ، احتیاس ادرار، بیبوست ، افزایش رفلاکس معده و ...) بروز عوارض اکستراپیرامیدال، افت فشارخون، تشنج، تعریق، افسردگی، و اختلالات خونی، واکنشهای حساسیت پوستی، خشکی، وزوز گوش، افزایش اشتها و افزایش وزن با مصرف طولانی مدت.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید به بیمارستان منتقل شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

اشکال دارویی:

- قرص های ۲۵ میلی گرم در جعبه های ۱۰۰ عددی.
- قرص های ۷۵ میلی گرم در جعبه های ۱۰۰ عددی.

AN: OSVE – CINNARIZINE - 202

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به مسئول پستی: ۱۲۱۵۵-۱۵۵۴ info@osvahpharma.com ارسال فرمائید. و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com

OSVE

شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com



DEXAMETHASONE BRO | 140 x 85 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 95/12/22