

هیوسین-ان - بوتیل بروماید

اسوه - هیوسین (۲۰ میلی گرم/ میلی لیتر)

آمپول

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا آن مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

دوره درمان را کامل کنید.

مصرف این دارو تنها با نسخه پزشک مجاز می باشد.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

داشتن حساسیت به هیوسین و یا سایر الکلوتیدهای بلادونای طبیعی مانند (آتروپین، بلادونا هیوسامین و یا هر محصولی که به نحوی مربوط به این گروه باشد یا مواد دیگر مانند غذاها مواد محافظ و یا رنگها) در کودکان احتمال بروز هيجان غير عادی، عصبی شدن، بیقراری و حساس شدن و احساس گرمای غیر طبیعی، خشکی، گرگرفتگی صورت بیشتر می باشد.

تجویز آنتی کولینرژیکها برای کودکان در هوای گرم ، ممکن است سبب افزایش سریع در دمای بدن گردد، بخصوص در نوزادان و کودکانی که اسپاسم مداوم یا آسیب مغزی دارند احتمال بروز عوارض جانبی شدید بیشتر می باشد.

در افراد مسن عدم هوشیاری یا از دست دادن حافظه، بیوست، ادرارمشکل، خواب آلودگی، خشکی دهان، بیثی، گلو، یا پوست و هیجان غیر معمول، عصبی شدن، بیقراری یا حساس شدن احتمال وقوع بالاتری دارد. همچنین درد در چشم ممکن است ایجاد شود که نشانه ای از گلوکوم می باشد.

در صورت مصرف سایر دارو خصوصاً: ضد اسید ها یا داروهای اسهال مانند کائولن، کتوکنازول (استفاده از داروهای فوق ممکن است اثرات داروی آنتی کولینرژیک ها را کاهش دهد)، داروهای خواب آور، آنتی کولینرژیک های دیگر (آنهایی که برای اسپاسم یا کرامپهای شکمی یا معدی استفاده می شوند)، ضد افسردگیهای سه حلقه ای (مانند آمی تریپتیلین، آموکسایپن، کلومیپرامین، دزپیرامین، دوکسپین، ایپی پرامین، نورتریپتیلین، پروتریپتیلین، تریمیپرامین) پتاسیم گراید.

در صورت وجود بیماریهایی نظیر: مشکلات خونی (شدید)، آسیب مغزی (در کودکان)، کویت (شدید) خشکی دهان (شدید و مداوم)، پروستات، تب، گلوکوم، بیماری قلب، ففک مربوط به مری (hiatal) Harnia فشار خون بالا، مسدود شدن روده یا سایر مشکلات روده ای، بیماری ریوی (مزمّن) میاستنی گراویس، مسمومیت حاملگی، انسداد مجرای ادراری، تخلیه ادرار مشکل، سندرم داون، بیماری گلیوی، بیماری های کبدی، تیروئید پرکار، اسپاسم مداوم (در کودکان).

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

شکل دارویی تزریقی: (عضلانی، آهسته وریدی، زیر جلدی)

افراد مسن: بزرگسالان و نوجوانان: ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم ۳ تا ۴ مرتبه در روز، پزشک شما ممکن است دوز را در صورت نیاز تغییر دهد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

تزریق این دارو در دوران بارداری و شیردهی مگر با صلاحدید پزشک متخصص ممنوع می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند ولی در صورت بروز ممکن است به مشورت با پزشک نیاز باشد:

شیوع بیشتر:

بیوست (یا هیوسامین شیوع کمتری دارد). تعریق کمتر، خشکی دهان، بیثی، گلو یا پوست.

نشانه های مسمومیت:

تاری دید (مداوم) یا تغییراتی در دید نزدیک، عدم توانایی یا حالت ناپایدار در حرکات، عدم هوشیاری تشنج، اشکال در نفس کشیدن، ضعف ماهیچه (شدید) ، یا خشکی (شدید)، سرگیجه، خواب آلودگی (شدید)، خشکی دهان، بیثی یا گلو (شدید)، ضربان قلب تند، تب، توهم، گفتار نامفهوم، هيجان غير عادی، عصبی شدن، بیقراری، یا تحریک، گرمای غیر عادی، خشکی و گرگرفتگی پوست .

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر دارو ها خصوصاً: ضد اسید ها یا داروهای اسهال مانند کائولن، کتوکنازول . (استفاده از داروهای فوق ممکن است اثرات داروی آنتی کولینرژیک را کاهش دهد) داروهای خواب آور، آنتی کولینرژیک ها ی دیگر (آنهایی که برای اسپاسم یا کرامپهای شکمی یا معدی استفاده می شوند)، ضد افسردگیهای سه حلقه ای (مانند آمی تریپتیلین، آموکسایپن، کلومیپرامین، دزپیرامین، دوکسپین، ایپی پرامین، نورتریپتیلین، پروتریپتیلین، تریمیپرامین)، پتاسیم گراید، موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. مسمومیت بخصوص برای کودکان با سن کمتر خطرناک است.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم نگهداری نمایید.

دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی:

ده آمپول ۲۰ میلی گرم در یک میلی لیتر به همراه بروشور در یک جعبه مقوایی

صد آمپول ۲۰ میلی گرم در یک میلی لیتر به همراه بروشور در یک جعبه مقوایی

REFERENCE: USP DI 2007
Martindale pharmaceutical 2012

AN: OSVE-Hyoscine 20-201

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به صندوق پستی: ۱۵۲۴-۱۳۱۵
و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com ارسال فرمایید.

OSVE

شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com

OSVE - Hyoscine brochure | 85 x 140 mm

OSVE Pharmaceutical Co.

Date: 98-10-03

Navaei

Print description: Pantone No.: 513C | Black