

لوراتادین

قرص

راهنمایهای عمومی:

لوراتادین از دسته داروهای آنتی هیستامین محسوب می شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

- ◀ در صورت وجود حساسیت به لوراتادین یا سایر آنتی هیستامین ها و نیز سایر مواد مثل غذاها، مواد محافظ و رنگها
- ◀ در صورت بارداری یا دوران شیردهی.
- ◀ در صورت مصرف داروهای دیگر به همراه این دارو
- ◀ در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر مانند هیپرتروفی پروستات، احتباس ادراری، گلوکوم یا زاویه بسته و یا انسداد مثانه

فارماکوکینتیک:

مصرف غذا به همراه دارو می تواند میزان جذب لوراتادین و متابولیت فعال آنرا به ترتیب ۴۰٪ و ۱۵٪ افزایش دهد. لوراتادین به میزان ۹۷٪ به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توسط سیتوکروم P-450 کبدی به متابولیت فعال خود متصل می شود. نیمه عمر این دارو در بدن ۲۰-۳ ساعت می باشد. این دارو پس از ۱ تا ۳ ساعت اثر خود را شروع کرده و پس از ۸ تا ۱۲ ساعت به حداکثر اثر خود می رسد. حدود ۸۰٪ لوراتادین در طول ۱۰ روز از طریق ادرار و مدفوع دفع شده و ۲۵٪ آن در ۲۴ ساعت اول به صورت کژدوگه در ادرار ترشح می شود.

موارد مصرف:

- ◀ برطرف کردن علائم مربوط به رینیت آلرژیک فصلی
- ◀ درمان کپیر مزمن ایدیوپاتیک

موارد منع مصرف:

- ◀ به جز در شرایط خاص، مصرف این دارو در موارد زیر توصیه نمی شود:
- ◀ نارسایی عملکرد کبدی
- ◀ نارسایی عملکرد کلیوی

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

این دارو از نظر طبقه بندی سازمان غذا و داروی آمریکا در دوران بارداری در رده B قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک متخصص صورت بگیرد.

هشدارها و نکات قابل توجه:

- ◀ دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید.
- ◀ مصرف این دارو در موارد زیر بایستی با احتیاط و پس از بررسی و ارزیابی مزایا و معایب دارو برای بیمار، صورت گیرد:
 - o انسداد مجرای خروجی مثانه
 - o هیپرتروفی پروستات علامت دار
 - o احتباس ادراری و یا استعداد ابتلا به آن
 - o گلوکوم با زاویه بسته و یا استعداد ابتلا به آن
- ◀ در صورت استفاده از داروهای آنتی هیستامینی و نیاز به انجام تستهای پوستی برای حساسیت، پزشک خود را از استفاده از داروهای آنتی هیستامینی مطلع نمائید.
- ◀ از آنجا که مصرف این دارو می تواند منجر به گیجی و خواب آلودگی گردد، توصیه می شود حین مصرف آن از رانندگی و انجام اموری که نیاز به هوشیاری کامل دارند بپرهیزید.
- ◀ مصرف این دارو می تواند موجب کاهش ترشح بزاق و خشکی دهان شود. ادامه دار شدن خشکی دهان احتمال وقوع بیماری های لثه و دندان را افزایش می دهد.
- ◀ به طور کلی مصرف داروهای آنتی هیستامین در نوزادان و کودکان نارس به علت استعداد بالاتر این دسته از بیماران به بروز عوارض آنتی کولینرژیک و تضعیف سیستم اعصاب مرکزی توصیه نمی شود ولی به نظر می رسد نسبت به داروهای آنتی هیستامین نسل اول، لوراتادین با احتمال کمتری باعث بروز عوارض مذکور در کودکان می شود. از طرف دیگر برخلاف سایر داروهای آنتی هیستامین، عوارض پارادوکسیکال (شامل بی قراری و تحریک پذیری) با داروی لوراتادین در کودکان مشاهده نشده است.

مقدار و نحوه مصرف:

- ◀ بزرگسالان، نوجوانان و کودکان بیشتر از ۶ سال: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز؛ در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی و نارسایی کلیوی (کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه) دوز شروع کننده بایستی ۱۰ میلی گرم یک روز در میان در نظر گرفته شود.
- ◀ کودکان ۶ تا ۵ سال: ۵ میلی گرم یک بار در روز
- ◀ برای کاهش تحریکات گوارشی ناشی از این دارو، می توانید آنرا به همراه غذا و یا شیر میل نمائید.
- ◀ در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض یادآوری آنرا مصرف کنید ولی اگر زمان یادآوری نزدیک دوز بعدی می باشد، از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمائید.

لوراتادین

قرص

عوارض جانبی:

هر فراورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی (حتی اگر در اینجا ذکر نشده) در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به اقدامات درمانی و توجهات پزشکی دارند:

با شیوع کمتر یا نادر: آنافیلاکسی، دیسکرازی خونی، آرتمی قلیی، تپش قلب و تاکی کاردی (ضربان قلب سریع)، گلستاز و سایر ناراحتی های کبدی، تشنج، ادم، پارستزی، کپیر

عوارض جانبی دیگری ممکن است واقع شوند که معمولا نیاز به توجهات پزشکی ندارند. این عوارض جانبی ممکن است در طی درمان از بین بروند. با این وجود اگر هر یک از عوارض جانبی زیر ادامه پیدا کرد یا آزار دهنده بود به پزشک خود اطلاع دهید:

با شیوع بیشتر: خواب آلودگی (وابسته به دوز؛ در مقادیر بالاتر با احتمال بیشتری رخ می دهد)، خشکی دهان، بیبی یا گلو ی خشک، ناراحتی در دستگاه گوارش، درد معده یا تهوع، سردرد، افزایش اشتها و افزایش وزن، التهاب گلو و افزایش غلظت موکوس

عوارض جانبی دیگری که در بالا آورده نشده اند ممکن است در بعضی بیماران مشاهده شوند. اگر شما هر عارضه دیگری را متوجه شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از هر یک از داروهای زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

- ◀ آنتی کولینرژیکها؛ احتمال بروز عوارض جانبی مانند خشکی دهان ناشی از مصرف آنتی هیستامین ها یا آنتی کولینرژیکها بیشتر می شود.
- ◀ الکل و یا داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی؛ اثراتی همچون خواب آلودگی ناشی از مصرف داروی تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی یا آنتی هیستامین ها، ممکن است بدتر شوند. مصرف مایپروتیلین یا ضد اسفردگی های سه حلقه ای ممکن است باعث تشدید بعضی عوارض جانبی ناشی از هر یک از این داروها مانند خشکی دهان شود.
- داروهای دارای خاصیت مهار کنندگی مونوآمینوآکسیداز (MAOIs) مصرف همزمان لوراتادین با این دسته از داروها ممکن است باعث تشدید عوارض تضعیف CNS (مانند خواب آلودگی) و علائم آنتی کولینرژیک (خشکی دهان) گردد. مصرف این داروها با هم توصیه نمی شود.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از اندازه و یا تصادفی این دارو، بیمار را به مرکز درمانی منتقل نمائید. کودکان و سالمندان استعداد بیشتری برای بروز عوارض این دارو، دارند.

شرایط نگهداری:

- ◀ دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
- ◀ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- ◀ از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمائید.

بسته بندی:

- ◀ هر قرص محتوی ۱۰ میلی گرم لوراتادین
- ◀ ۱۰۰ عدد قرص به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی

Reference: USP DI Drug Information for Health care Professionals, 2007

AN.: Loratadine 10-203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به مسئول پستی ۱۵۲۴-۱۲۱۸
و یا پست الکترونیکی: info@osvehpharma.com (ارسال فرمائید.



شرکت داروسازی اسوه
www.osvehpharma.com



Loratadine BRO | 150x110 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 95/12/22

Print description: Pantone No.: 258 C Black