



چاپ اکسیر

SIZE : 140mm×85mm

Date : 99.04.04

Pantone No.: 137C



Black

قرص روکشدار

۱۳۵ مبورین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران حتی آهایی که علاجی شیشه بیماری شما داشته باشند خودداری نمایید.

اهنگ های عمومی:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذا ها، رنگها و مواد محافظ.

۰۹- آنجاییکه این دارو ممکن است سبب سرگیجه شود لذا در حین درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری نمایید.

از آنجاییکه این اثر بدون و اسطه سیستم اتونوم اعمال میشود عوارض جانی آنتی کولینرژیک وجود نخواهد داشت و در بیماران مبتلا به هیپرتروفی پروستات و گلوكوم داروی مناسبی است.

- برای اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز تماس بگیرید.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

آزمایشات روی حیوانات اثر تراتوژنی ن-

استفاده داروی

- دارو در دوزهای درمانی در شیر مادر ترشح نمیشود.
 - موارد مصرف:
 - بزرگسالان:
 - درمان علائمی درد و گرفتگی عضلات شکمی
 - ناراحتی روده مربوط به سندروم روده تحریک پذیر
 - درمان اسپاسمها گوارشی ناشی از اختلالات ارگانیک
 - مقاوم نرم مصرف:

مقدار و میزان مصرف.
هر کوچه ۱۲۵ میلی گرمی ۳ بار در روز (صبح و عصر) از راه خوراکی ترجیحاً قبل از غذا یا با غذا.

مسنونات

از نظر تئوری در مصرف بیش از اندازه دارو تحریک پذیری سیستم عصبی قابل بیش بینی است.

دومان:

و ادار کردن فرد مسموم به استقراغ با شستشوی معده و درمان علامت توصیه شده است.

عوادض حانی:

به طور کلی این دارو به خوبی تحمل میشود در موارد نادر در بعضی افراد واکنشهای پوستی و سرگیجه گزارش شده است.

سونے ہاضمہ، سو

بیوست، بیقراری
شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کم

پسته بندی: پسته بندی کشک برای سرمه با استفاده از ۳٪ تکلیف می‌باشد.

AN: Meboverine135 -201

AN: Mebeverine 135-201
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به مستندی بسته: ۱۳۸۵-۱۰۰۴

و يا هست الكتروشينك: info@csvepharma.com ارسال فرم