

ویتامین ب ۱/ب ۶/ب ۱۲ نوروتری ویت[®] آمپول

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف طبق دستور پزشک تعیین می گردد.
توجه: به دلیل وجود بنزیل الکل (به عنوان نگهدارنده) در این دارو، از مصرف آن در نوزادان عادی و یا نوزادان نارس اجتناب شود.

ناسازگاریها:

ویتامین ب ۱:

ویتامین (ب ۱) در محلولهای قلیایی یا خنثی ناپایدار است بنابراین تجویز آن همراه با کربناتها، سیتراها، باربیتوراتها، یونهای مس توصیه نمی شود. بعلاوه، پایداری آن در محلولهای وریدی که شامل سدیم بی سولفات (بعنوان یک آنتی اکسیدان) یا پروزوتان است ضعیف است؛ اگر این محلولها باید استفاده شوند، باید بلافاصله پس از اضافه کردن تیامین مورد استفاده قرار گیرند.

ویتامین ب ۱۲:

سیانوکوبالامین تزریقی بطور فیزیکی با وارفارین سدیم برای تزریق ناسازگار است.

هشدارها و نکات قابل توجهه حین مصرف دارو:

- در زمان مصرف ویتامین ب ۱۲، پیکری در انجام تستهای خونی، هر ۳ تا ۶ ماه اهمیت دارد.
- ویتامین ب ۱، ویتامین ب ۶، ویتامین ب ۱۲ تزریقی فقط باید توسط گروه پزشکی یا تحت نظارت آنها تزریق شوند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها ممکن است نیاز به توجهات پزشکی باشد.

ویتامین ب ۱:

اگر هر یک از عوارض جانبی زیر واقع شد فوراً با پزشک مشورت نمایید:

نادر: این عوارض فقط پس از تزریق و سریعاً ممکن است ایجاد شوند: سرفه، اشکال در بلع، کپیر، خارش پوست، بادکردن صورت، لبها یا پلکها، خس خس سینه یا وجود مشکل در درس کشیدن

ویتامین ب ۶:

در نوزهای بالا: عدم توانایی در هماهنگی بدنی، بیحسی دستها یا پاها

ویتامین ب ۱۲:

سیانوکوبالامین یا هیدروکسوکوبالامین معمولاً عارضه ای ایجاد نمی کنند. با این وجود اگر هر یک از عوارض جانبی زیر مشاهده شد، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:

نادر:

عوارضی که در صورت ادامه پیدا کردن و یا آزار دهنده بودن باید در سریعترین زمان ممکن به پزشک اطلاع داده شوند شامل موارد زیر می باشند:

با شیوع کمتر:

اسهال، خارش پوست

توجه:

ویتامینهای محلول در آب به بندرت باعث سمیت در افراد با عملکرد کلیوی نرمال می شوند.

درمان:

ویتامین ب ۱۲ می تواند با علائم نوعی پلی سیمتی (افزایش تعداد گلبول قرمز) همراه باشد.

شرایط نگهداری:

داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

در پخچال (۸-۲۰ درجه سانتیگراد) و دور از نور نگهداری شده و از یخ زگی محافظت گردد.

در مصرف دارو، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

بسته بندی:

- هر آمپول ۳ میلی لیتری حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین ب ۱، ۱۰۰ میلی گرم ویتامین ب ۶ و ۱۰۰۰ میکروگرم ویتامین ب ۱۲
- ده عدد آمپول ۳ میلی لیتری در یک جعبه مقوایی به همراه یک بروشور

Reference: USP DI; for Healthcare Professional, 2007

AN: Neurotriv[®] - 204

لطفاً نظرات و پیشنهادها خود را در مورد این دارو

به صندوق پستی ۱۵۵۴-۱۲۷۸۵

و یا پست الکترونیکی: Info@osvapharma.com ارسال فرمائید.

OSV

شرکت داروسازی اسوه

www.osvapharma.com

ویتامین ب ۱/ب ۶/ب ۱۲ نوروتری ویت[®] آمپول

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

- دوره درمان را کامل نمایید.

- مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.

- چنانچه سوال یا نکته مبهمی درمورد مصرف این دارو به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

- راهنمایی های عمومی قبل از شروع مصرف دارو:

- قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

0 در صورت سابقه حساسیت به ویتامین ب ۱، ویتامین ب ۶ و یا ویتامین ب ۱۲ یا سایر داروها، غذاها، مواد

محافظ، رنگها و غیره

0 در صورت بارداری یا شیردهی

- در صورتیکه مکمل رژیمی- غذایی و یا داروی دیگری را مصرف می نمایید

- بعضی شرایط ممکن است نیاز به ویتامین ب ۱ را افزایش دهد، مانند الکلیسم، سوختگی، اسهال (مداوم)، تب

(مداوم)، بیماری (مداوم)، بیماری روده ای، بیماری کبدی، تیروئید پرکار، استرس (مداوم)، برداشت معده یا عمل جراحی

- دو دسته از افراد ممکن است دچار کمبود ویتامین شوند: ۱- افرادی که همودیالیز می شوند- ۲- افرادی که

کارهای سنگین بدنی را بصورت روزانه انجام می دهند.

- کمبود ویتامین ب ۱ ممکن است به بیماری بری بری منجر شود. علائم این بیماری عبارتند از: از دست دادن

اشتها، بیوست، ضعف ماهیچه، درد یا احساس سوزش و خارش در بازوها یا پاها و باد کردن احتمالی پاها یا

قسمتهای پایین ساق پا.

- بعضی شرایط ممکن است نیاز به ویتامین ب ۶ را افزایش دهند: الکلیسم، سوختگیها، اسهال، دیالیز، بیماری

قلبی، مشکلات روده ای، بیماری کبدی، تیروئید پرکار، استرس، بیماری طولانی مدت، جراحی شدید، برداشت

معدنه یا عمل جراحی.

- کمبود ویتامین ب ۶ ممکن است منجر به آنمی، تخریب عصبی، تشنج، مشکلات پوستی و زخم در دهان شود.

- افرادی که در رژیم شدید گیاهخواری هستند ممکن است به مکملهای حاوی ویتامین ب ۱۲ نیاز پیدا کنند.

- قبل از درمان با ویتامین ب ۱۲، باید تشخیص کمبود آن توسط آزمایش مشخص شود، زیرا در صورت کمبود

فولیک اسید، تجویز ویتامین ب ۱۲، این کمبود را مخفی می سازد.

- مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک متخصص باشد.

موارد منع مصرف و یا نیازمند به ملاحظات پزشکی:

در موارد زیر فواید و مضرات دارو باید در نظر گرفته شود:

- ویتامین ب ۱:

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

نوعی آنسفالوپاتی با نام Wernicke

ویتامین ب ۶:

در صورت حساسیت به پیریدوکسین

ویتامین ب ۱۲:

- سیانوکوبالامین در صورت وجود بیماری لیر (Leber) نباید مصرف شود.

- در صورت حساسیت به سیانوکوبالامین یا هیدروکسوکوبالامین

تداخلات غذایی و دارویی:

ترکیباتی که هر یک از مواد زیر را داشته باشند، بسته به مقدار آنها ممکن است با پیریدوکسین (ویتامین ب ۶)

تداخل داشته باشند:

- لوودوپا: در صورتیکه پیریدوکسین با لوودوپا مصرف شود ممکن است از عملکرد صحیح لوودوپا جلوگیری کند.

- سیکلوسرین یا ایتونامید یا هیدرالازین

- بعضی از سرکوب کننده های سیستم ایمنی مانند آرتیروپین، گرامیسیل، کورتیکوستروئیدها، کورتیکوتروپین

(ACTH)، سیکلوفسفامید و مرکاپتوپورین

- ایزونازید

- پنی سیلایم

- استروئیدها

- کنتراستپوهای حاوی استروژن، کنتراستپوهای خوراکی

ترکیباتی که هر یک از مواد زیر را داشته باشند، بسته به مقدار آنها ممکن است با مکملهای ویتامین ب ۱۲ تداخل

داشته باشند:

- الکل (مصرف بیش از اندازه برای مدت بیش از دو هفته)

- آمینوسالیسیلاتها یا کلشی سین (بخصوص در ترکیب با آمینو گلیکوزیدها)

- آنتی بیوتیکها

- فولیک اسید



Neurotriv[®] BRO | 140 x 85 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 97/12/ 18