

ویتامین ب کمپلکس

اسوه - ویتامین ب کمپلکس

آمپول

راهنمایی های عمومی:

◀ آمپول ویتامین ب کمپلکس حاوی محلول استریلی است که از طریق تزریق داخل عضلانی و یا انفوزیون وریدی قابل استفاده می باشد.
 ▶ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری فرمایید.
 ▶ قبل از مصرف این دارو، در صورت سابقه حساسیت به هر یک از اجزای این دارو، با پزشک خود مشورت نمایید.
 ▶ این برگه راهنما حاوی تمامی اطلاعات مربوط به این دارو نمی باشد لذا در صورت داشتن هر گونه سؤال و ابهام در رابطه با مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف:

این دارو در موارد نیاز به تزریق ویتامین های گروه ب از جمله قبل و بعد از اعمال جراحی و موقعیت هایی مانند تب، سوختگی شدید، افزایش متابولیسم، مشکلات گوارشی که منجر به آشکال و یا عدم جذب ویتامین ها می گردند، کاهش وزن، اعتیاد به الکل به کار می رود.

موارد منع مصرف:

▶ حساسیت به هر کدام از اجزای دارو

هشدارها و نکات مهم:

▶ احتمال بروز شوک آنافیلاکسی متعاقب مصرف تزریقی تیامین (از اجزای دارو) وجود دارد. در موارد مشکوک به حساسیت، استفاده از یک دوز داخل وریدی به عنوان تست توصیه می شود.
 ▶ به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در کودکان نارس و یا کامل استفاده شود.
 ▶ در صورت مشاهده هر گونه رسوب، ذره و یا تغییر رنگ در دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
 ▶ مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط باید با نظر پزشک متخصص صورت پذیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

▶ مقدار مصرف هر دارو را پزشک مشخص می کند.
 ▶ آمپول بایستی به صورت تزریق داخل عضلانی و یا انفوزیون وریدی استفاده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر عارضه جانبی (حتی اگر در اینجا ذکر نشده) سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید:
 اسهال خفیف و گذرا، پل سیتمی، ترومبوز عروق محیطی، خارش، احساس تورم در تمام بدن، شوک آنافیلاکسی، پاراستری (احساس گزگز و یا بی حسی در انگشتان پا و دست)، آتاکسی (عدم تعادل)، سندرم آسیب به اعصاب حسی، احساس گرما و گر گرفتگی، کهیر، ضعف، تعریق، تهوع، سیانوز و ادم ریوی

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان و یا سابقه ی مصرف هر داروی دیگر، به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید.

▶ لوودوپا: پیریدوکسین (از اجزای این دارو) می تواند اثر بخشی داروی لوودوپا را از طریق افزایش متابولیسم محیطی آن، کاهش دهد.

▶ فنی توئین: پیریدوکسین (از اجزای این دارو) می تواند باعث کاهش سطح سرمی فنی توئین گردد.

شرایط نگهداری:

▶ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

▶ از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

▶ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور درون جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

شکل دارویی و بسته بندی:

▶ هر آمپول ۲ میلی لیتری محتوی: ۱۰ میلی گرم تیامین هیدروکلراید (ب ۱)، ۴ میلی گرم ریبوفلاوین به صورت سدیم فسفات (ب ۲)، ۴ میلی گرم پیریدوکسین هیدروکلراید (ب ۳)، ۴۰ میلی گرم نیکوتین آمید، ۶ میلی گرم دکسپانتتول، پلی سوربات ۸۰ و بنزیل الکل
 ▶ ۱۰ آمپول ۲ میلی لیتری به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی
 ▶ ۱۰۰ آمپول ۲ میلی لیتری به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی

REFERENCE

Drug Facts & Comparisons, 2006

AN: OSVE-Vit B Complex - 202

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به صندوق پستی ۱۳۱۵۵-۱۳۱۵۵۲
 و یا پست الکترونیک: info@osvalpharma.com ارسال فرمایید.



شرکت داروسازی اسوه
 www.osvalpharma.com

OSVE - Vitamin B Complex brochure | 85 x 140 mm

OSVE Pharmaceutical Co.

Navaei Date: 98-10-03

Print description: Pantone No.: 187C | Black