

پیروکسیکام

آمیول

راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف به دیگران خودداری نمایید.

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

مصرف پیروکسیکام تنها با نسخه پزشک مجاز می باشد.

قبل از مصرف در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

0 در صورت داشتن حساسیت به پیروکسیکام، آسپرین یا دیگر ضد التهاب های غیراستروئیدی مانند ایبuprofen و ناپروکسن، اجزاء تشکیل دهنده دارو، غذاها، مواد محافظ، رنگها و...

0 در صورت استفاده از داروها یا مکمل های رژیمی غذایی دیگر

0 در صورت انجام تست قند خون: مصرف این دارو می تواند باعث کاهش یا افزایش غلظت گلوکز خون شود.

0 در صورت بارداری و شیردهی

0 سالندان: ریسک تشدید سمیت به ویژه در خانها

0 در صورت ابتلا به سایر بیماریها مانند نارسایی کلیوی (ریسک تشدید سمیت)؛ آسم حساس به آسپرین (ریسک تنگی مجاری هوایی)، سابقه خونریزی گوارشی، بیماریهای التهابی فوقانی یا تحتانی سیستم گوارش مانند کرون، دایورتیکولیت، کولیت اولسراتیو، پپتیک اولسر؛ هموفیلی و یا سایر بیماریهای انعقادی

0 در صورت انجام جراحی: مصرف این دارو می تواند ریسک خونریزی حین جراحی و پس از آن را افزایش دهد. بازگشت فعالیت پلاکتی پس از ۲ هفته قطع مصرف این دارو رخ می دهد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

درده C رده بندی FDA در دوران بارداری: مصرف این دارودر سه ماهه اول بارداری بایستی با نظر پزشک صورت پذیرد. مصرف این دارو در نیمه دوم بارداری توصیه نمی شود.

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. این دارو در شیر ترشح شده و بر اساس مطالعات حیوانی می تواند باعث مهار ترشح شیر شود.

تداخلات غذایی و دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، حتما قبل از مصرف پیروکسیکام با پزشک خود مشورت کنید:

الکل، کورتیکواستروئیدها، کورتیکوتروپین (در مصارف طولانی مدت) و مکمل های پتاسیم: مصرف همزمان می تواند ریسک ابتلا به عوارض گوارشی مانند خونریزی و زخم را افزایش دهد.

آنتی کوآگولانت های کومارینی یا مشتقات اینداندیون، هپارین، فراورده های ترومبولیتیک و وارفارین: افزایش ریسک خونریزی؛ بیمار از نظر علائم خونریزی مانیتور شود.

تزیامترن: احتمال کاهش اثربخشی داروی ضد فشار خون وجود دارد. توصیه می شود مانیتورینگ پاسخگویی داروی کاهنده فشار خون با تواتر بیشتری انجام شود.

آسپرین و سایر NSAIDs: احتمال تشدید عوارض گوارشی مانند زخم و خونریزی بیشتر شده در حالیکه اثرات درمانی بیشتری حاصل نمی شود. مصرف همزمان دو NSAID توصیه نمی شود.

سفامندول، سفوپرازون، سفوتتان، پلیکامپسین و والپروئیک اسید: احتمال تشدید سمیت پلاکتی و افزایش ریسک خونریزی

سیکلوپسورین: احتمال افزایش ریسک سمیت کلیوی سیکلوپسورین وجود دارد. بیمار به دقت مانیتور شود.

لیتیم: احتمال افزایش سطح خونی لیتیم وجود دارد لذا مانیتورینگ دقیق تر غلظت لیتیم توصیه می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند.

پیروکسیکام را به صورت داخل عضلانی تزریق نموده و از تزریق داخل وریدی آن خودداری نمایید.

پیروکسیکام بایستی در یک مرکز درمانی و تحت نظر پزشک تزریق گردد.

موارد منع مصرف:

به جز در شرایط خاص و با نظر پزشک، مصرف پیروکسیکام در موارد زیر توصیه نمی شود:

سابقه واکنش های آلرژیک شدید مانند آنافیلاکسی و آنژیوادم ناشی از مصرف آسپرین یا سایر NSAIDs

پولپ بینی همراه با برونگواسپاسم ناشی از آسپرین

کودکان زیر ۱۵ سال

پیروکسیکام

آمیول

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه یا مشورت با پزشک داشته باشد.

اگر هر کدام از علائم زیر را داشته باشید، حتما به اورژانس مراجعه کنید:

▶ آنافیلاکسی (کهیر، مشکل در تنفس، تورم صورت، لبها، زبان یا گلو)؛ احساس ضعف در عضلات پا

اگر هر کدام از این اثرات جانبی جدی را داشتید استفاده از پیروکسیکام را متوقف کنید و با پزشک خود تماس بگیرید:

▶ درد سینه، ضعف، کوتاهی تنفس، سخن گفتن مبهم، مشکل در دید یا تعادل؛ مدفوع سیاه، بالا آوردن خون یا استفراغ که شبیه دانه های قهوه باشد؛ تورم یا افزایش وزن سریع؛ تغییر رنگ ادرار، زرد شدن پوست یا چشمها، تب و لرز، گلودرد، سردرد، تاول، پوسته شدن، راش قرمز پوست؛ کبودی، سوزش، بی حسی، درد، ضعف ماهیچه، سختی گردن، افزایش حساسیت به نور، تشنج

اگر هر کدام از این اثرات جانبی را داشتید به مصرف پیروکسیکام ادامه دهید ولی با پزشک خود مشورت کنید:

▶ سوزش یا درد معده، اسهال یا یبوست؛ نفخ، گیجی، سردرد، حمله عصبی؛ خارش یا راش پوستی؛ تاری دید، کاهش شنوایی و وزوز گوش

اگر دچار علائم دیگری شدید که به نظر غیر معمول یا آزار دهنده می آمد با پزشک خود مشورت کنید.

شرایط نگهداری:

▶ دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

▶ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

▶ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شکل دارویی و بسته بندی:

▶ هر آمپول ۱ میلی لیتری محتوی ۲۰ میلی گرم پیروکسیکام

▶ ۱۰ آمپول به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی

Reference: USP DI Drug Information for Healthcare Professionals: 2007

AN:Piroxicam -204

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به مسئول فروش OSI ارسال کنید.

و یا پست الکترونیکی: info@osvapharma.com ارسال فرمایید.



شرکت داروسازی اسوه

www.osvapharma.com

Piroxicam BR 140x85 mm

OSVE Pharmaceutical Co.

Date: 1403/11/27

Print description: Pantone No.:

Design by: Hadi Naseri

Pantone

400C

Black