

- هر قرص زوج روکشدار تالاویت* حاوی:
۱۰۰ میکروگرم سلنیوم
12 IU ویتامین E
2666 IU ویتامین A

- بسته تالاویت* حاوی دو عدد بلیستر ۱۰ عددی
قرص فرد و دو عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص زوج
داخل جعبه مقوایی می باشد.

است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود
اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود
ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی در اسرع
وقت با پزشک مشورت کنید.

موارد قابل توصیه:

- بیش از مقدار توصیه شده از این مکمل استفاده
نشود.
- با توجه به وجود ویتامین B2 در قرص های فرد،
در صورت مصرف این فرآورده ممکن است رنگ
ادرار زردتر شود که این امر طبیعی می باشد.
- جهت پیشگیری از بروز عوارض گوارشی
بهتر است این مکمل همراه غذا یا بعد از غذا
مصرف شود.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه
شده توسط پزشک، بیمار بایستی به بیمارستان
منتقل شود.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور
و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شکل دارویی و بسته بندی:

- هر قرص فرد روکشدار تالاویت* حاوی:
۳/۴۴ میلی گرم زینک بصورت گلوکونات
۱/۱ میلی گرم ویتامین B1
۱/۴ میلی گرم ویتامین B2
۱/۴ میلی گرم ویتامین B6
۲/۵ میکروگرم ویتامین B12
۱۶ میلی گرم ویتامین B3
۶ میلی گرم ویتامین B5
می باشد.

AN.: Thalavit®-203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴
info@osvahpharma.com ارسال فرمائید



شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com

راهنمایی های عمومی:

- این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده
است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه
مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.
- این فرآورده صرفاً مکمل بوده و جهت تشخیص،
پیشگیری و درمان نمی باشد.
- قبل از مصرف این فرآورده در صورت وجود سابقه
حساسیت به ویتامین ها و مواد دیگر از قبیل غذاهای،
مواد نگهدارنده و رنگ ها با پزشک مشورت کنید.
- این فرآورده را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف
نمایید.
- این برگه راهنما حاوی تمامی اطلاعات مربوط به
این فرآورده نمی باشد لذا در صورت داشتن هر گونه
سؤال در رابطه با مصرف این فرآورده با پزشک و یا
داروساز خود مشورت نمایید.

تالاویت* چیست؟

بیماری تالاسمی یک بیماری خونی ژنتیکی می باشد
که به علت نقص در سنتز یک یا چند زنجیره
هموگلوبین ایجاد می شود، که بسته به نقص در
گلوبین زنجیره آلفا یا بتا به ترتیب به تالاسمی آلفا
و تالاسمی بتا تقسیم می شوند که خود به دو شکل
مینور (خفیف) و ماژور (شدید) بروز می نماید.
بیماران مبتلا به تالاسمی بتا از نوع ماژور از دوران
طفولیت دچار آنمی همولیتیک، کاهش رشد و
ساختار اسکلتی غیرطبیعی می شوند. کودکان مبتلا
به بتا تالاسمی ماژور به تزریق منظم خون در طول
عمر خود نیاز دارند که این تزریق خون منجر به
تجمع آهن در این بیماران می شود. افزایش مزمن
آن در بدن به واسطه القای واکنش ها و استرس های
اکسیداتیو منجر به آسیب های بافتی به ویژه آسیب
به ارگان های حیاتی بدن از جمله قلب و کبد
می شود بنابراین مصرف آنتی اکسیدان هایی
نظیر سلنیوم و ویتامین E می تواند در این
بیماران سودمند باشد. همچنین تجمع آهن می تواند
باعث آسیب به محور هیپوتالاموس- هیپوفیز شود

مورد مصرف:

تامین ویتامین ها و املاح ضروری در بیماران تالاسمی

مقدار و نحوه مصرف فرآورده:

مقدار مصرف فرآورده بر اساس سن، جنس و شرایط
فیزیکی شخص توسط پزشک تعیین می شود.
میزان معمول مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا
به تالاسمی به شرح زیر می باشد:
- قرص های فرد، در روزهای فرد هفته، روزی
یک عدد
- قرص های زوج، در روزهای زوج هفته، روزی
یک عدد

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی باید با نظر
پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن