

اسوه – ويتامين ايبی	قرص جويدنی روکشداز	مکمل
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه کلیه عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

مسمومیت:

مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک سبب عوارض زیر می گردد:
اسهال، سرگیجه، ضعف یا خستگی، تاری دید، سردرد، تهوع و دردهای شکمی
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
از نگهداری و مصرف فرآورده پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

بسته بندی:

جعبه محتوی ۱۰۰ قرص جویینی روکشداز به همراه یک برگه راهنما

Reference: Lacy C. Drug Information Handbook, Lexi-comp; 19th edition

AN: OSVE - Vitamin E F.C Tab - 203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به صندوق پستی: ۱۵۵۴-۴۲۸۵
و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com ارسال فرمایید.



شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com

اسوه – ويتامين ايبی	قرص جويدنی روکشداز	مکمل
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

این فرآورده یک مکمل بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان بیماری نمی باشد.
این فرآورده برای فعلی شما تجویز شده است لذا آن در مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این فرآورده، در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:
• در صورت داشتن سابقه حساسیت به ویتامین ایی و یا سایر داروها، غذاها و مواد محافظ؛
• در صورت بارداری و شیردهی؛
• مصرف این فرآورده در کودکان و افراد مسن باید تحت نظر پزشک متخصص باشد.
• در صورت مصرف داروهای دیگر؛
• در صورت داشتن اختلالات انعقادی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ویتامین ایی در شیر ترشح گردیده و به مقدار کمی از جفت عبور می کند. مصرف این فرآورده در بارداری و شیردهی باید طبق نظر پزشک متخصص باشد.

هشدارها:

از مصرف این فرآورده بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون، نیازمند تأیید پزشک متخصص می باشد.
مصرف همزمان و زیاد هیدروکسید آلو مینیوم، گلستیرامین، پارافین و سوکرافیت می تواند بر روی جذب این فرآورده تأثیر گذارد.
از آنجایی که ویتامین ایی می تواند اثر ویتامین K را آنتاگونیزه کرده و سبب افزایش زمان انعقاد خون گردد بنابراین مصرف همزمان این دو فرآورده نیازمند تأیید پزشک متخصص می باشد.

مورد مصرف:

کمک به تأمین ویتامین ایی و آنتی اکسیدان

مقدار و نحوه مصرف:

هر قرص جویینی روکشداز حاوی ۱۰۰ واحد بین المللی (IU) از DL آلفاتوکوفرول استات (استروایزومر فعال بیولوژیک ویتامین ایی) می باشد. هر واحد بین المللی از DL آلفاتوکوفرول استات معادل ۱ میلیگرم از آن می باشد. مقدار مصرف هر دارو یا فرآورده را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این فرآورده به قرار زیر است:
مقدار توصیه شده روزانه (RDA):

نوزادان: ۴-۶ میلیگرم (مقدار دقیق RDA تعیین نشده است) کودکان ۱-۳ سال: ۶ میلیگرم، حداکثر ۲۰۰ میلیگرم در روز؛ کودکان ۴-۸ سال: ۷ میلیگرم، حداکثر ۳۰۰ میلیگرم در روز؛ کودکان ۹-۱۳ سال: ۱۱ میلیگرم، حداکثر ۶۰۰ میلیگرم در روز؛ کودکان ۱۴-۱۸ سال: ۱۵ میلیگرم، حداکثر ۸۰۰ میلیگرم در روز؛ بزرگسالان: ۱۵ میلیگرم، حداکثر ۱۰۰۰ میلیگرم در روز؛ زنان باردار: ۱۸ سال به پایین: ۱۵ میلیگرم، حداکثر ۸۰۰ میلیگرم در روز؛ زنان باردار ۱۹-۵۰ سال: ۱۵ میلیگرم، حداکثر ۱۰۰۰ میلیگرم در روز؛ در دوران شیردهی ۱۸ ساله و جوانتر: ۱۹ میلیگرم، حداکثر ۸۰۰ میلیگرم در روز؛ در دوران شیردهی ۱۹-۵۰ ساله: ۱۹ میلیگرم، حداکثر ۱۰۰۰ میلیگرم در روز

- برای پیشگیری از بروز کمبود ویتامین ایی:

O بزرگسالان: ۲۰ واحد در روز؛ آنتی داسی شکل: ۴۵۰ واحد در روز؛ دیس کینزی تاخیری: ۱۶۰۰ واحد در روز
O کودکان: سیسنتیک فیبروزیس: ۱۰۰-۴۰۰ واحد در روز؛ بتا تالاسمی: ۵۰-۷۵۰ واحد در روز

- برای درمان کمبود ویتامین ایی:

دوز درمانی فرآورده باید توسط پزشک و با توجه به شدت کمبود ویتامین ایی تعیین شود.
O کودکان: ۱ واحد/کیلوگرم/روز
O بزرگسالان: ۶۰۰-۷۰۰ واحد در روز

Vitamin E Tab Br

OSVE Pharmaceutical Co.

Date: 1402/04/21

Print description: Pantone No.:

Design by: Hadi Naseri

140 x 85 mm

Pantone

227C

Black